



ОБЩИНА МЪГЛИЖ

6180 гр. Мъглиж, пл. "Трети март" № 32
Тел.: 04321/33 01, 23 34; деловодство: 04321/21 02; Факс: 04321/22 55;
e-mail: obshtina@maglizh.bg; интернет страница: www.maglizh.bg
БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС EN ISO 37001:2016

МЕРКИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА НАДЗОРА И КОНТРОЛА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Западнонилската треска е вирусна зоонозна инфекция с трансмисивен механизъм на предаване. Заболяването е най-често срещано сред птиците и конете. Обикновено се разпространява при хората от заразени комари, които се инфектират от заразени птици. Вирусът може да се разпространява от човек на човек чрез кръвопреливане и трансплантация на органи, от майка на дете по време на бременност и кърмене и чрез лабораторно заразяване.

Вирусът на Западнонилската треска има широка географска циркулация в Европа, поради изобилието от комари от определен вид (*Culex*) на целия континент, които го разпространяват. Най-много случаи при хора се регистрират от юли до октомври, с пик през август – септември.

КЛИНИЧНА КАРТИНА:

Инкубационният период е между 3 и 14 дни. Около 80 % от инфекциите при хората протичат без симптоми. Около 20 % от заразените с вируса развиват заболяване - Западнонилска треска, което обикновено протича леко до умерено тежко, с грипоподобни симптоми – температура, главоболие, неразположение, умора. Възможна е и поява на макулопапулозен обрив, гадене и повръщане. При по-малко от 1 % от заболелите протичането е тежко и засяга нервната система (енцефалит, менингоенцефалит), предимно при хора в напреднала възраст и с придружаващи заболявания. Леталитетът при лица от рисковите групи достига до 17%.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ:

Личните предпазни мерки за предотвратяване на инфекцията включват използване на репелент за комари, носене на дрехи, които покриват откритите части от тялото, замрежване на прозорците, използване на уреди и препарати за домашна дезинсекция.

